

# *Anaitis praeformata* Hb. tagen i Sverige (Lep., Geometridae)

STIG TORSTENIUS

Torstenius, S.: *Anaitis praeformata* tagen i Sverige (Lep., Geometridae). [*Anaitis praeformata* Hb. recorded from Sweden (Lep., Geometridae)]. – Ent. Tidskr. 99:11–12 (1978). Lund, Sweden 10 April 1978. ISSN 0013-886X.

*Anaitis praeformata* Hb. previously known i.a. from Alandia, Finland, is reported from Norrby, Häverö parish, Uppland, Sweden, where a female was found on August 12th 1977.

S. Torstenius, Skogsliden 6, 182 74 Stocksund, Sweden.

Den 12 augusti 1977 fick jag på ljus en hona av *A. praeformata* Hb. i Norrby, Häverö socknen, Norrtälje kommun, Uppland. Fyndplatsen är en stugtomt mitt ute bland åkrar med berghållar och ganska rikligt med *Hypericum*. Platsen är belägen flera hundra meter från närmaste skogsmark och cirka 800 meter fågelvägen från Väddö, som i sin tur är yttersta utposten mot

nordvästra Åland. Såvitt jag vet är detta första gången, som arten noteras från Sverige.

*A. praeformata* Hb. är den största av de från norra delen av Europa kända *Anaitis*-arterna. De övriga är den i storlek närmast kommande *A. plagiata* L. och den ännu något mindre *A. efformata* Guen.

*A. praeformata* Hb. skiljer sig från de båda




Fig. 1–6. – 1. *Anaitis praeformata* Hb. ♂ Finland. och 2. ♀ Sweden, Upl., Häverö. – 3. *A. plagiata* L. ♂ och 4. ♀ Sweden, Upl., Jakobsberg. – 5. *A. efformata* Guen. ♂ och 6. ♀ Sweden, Sk., Bromölla. Photo: L. Imby.

andra arterna bl a genom att på framvingen ha ett rött snedstråk mellan inre tvärlinjen och rotlinjen och att inre tvärlinjens främre del är helt fylld med svart.

Från *A. plagiata* L. skiljer den sig vidare därigenom att yttre tvärlinjen i sin övre hälft bildar tre utåtgående spetsar medan det hos *plagiata* L. endast finns två och genom att bakkroppens bakersta segment är ungefär lika långt som de övriga bakkroppssegmenten och med trubbig ände medan denna led hos *plagiata* L. är mer än dubbelt så lång som de övriga och med spetsigare ände.

Alla tre arterna lever enligt litteraturen på *Hypericum*: i första hand på *H. perforatum* men även *H. maculatum*, som förekommer allmänt upp till mellersta Norrland.

*A. plagiata* L. är uppgiven ända upp till Ångermanland medan *A. efformata* Guen. endast är känd från de södra delarna av Sverige.

*A. plagiata* L. flyger åtminstone i Syd- och Mellansverige, liksom *A. efformata* Guen., i två generationer, slutet av maj-början av juli och augusti-september, medan *A. praeformata* Hb. tycks flyga i endast en generation från mitten av juli till mitten av augusti.

*A. praeformata* Hb. är närmast känd från Finland, där den förekommer på Åland och i södra delen av det finska fastlandet. Arten är en av dem som vi sedan länge väntat skall dyka upp i landet och jag hoppas att den fått ordentligt fotfäste hos oss. Som svenskt namn föreslår jag "Stor taggmätare".