

# En extremt ljus aberration av *Chiasmia clathrata* L. (Lep., Geometridae)

HÅKAN ELMQUIST

Elmquist, H.: En extremt ljus aberration av *Chiasmia clathrata* L. (Lep., Geometridae). [An extremely light aberration of *Chiasmia clathrata* L. (Lep., Geometridae)]. – Ent. Tidskr. 99:18 (1978). Lund, Sweden 10 April 1978. ISSN 0013-886X.

A female of *Chiasmia clathrata* L., with the brown transverse lines strongly reduced, was captured in the province Uppland 15 June 1974.

H. Elmquist, Höksjön, S-150 11 Björnlunda, Sweden.

Vid dagfångst den 15 juni 1974 i Bro, Uppland, fann författaren ett extremt ljust exemplar av *Chiasmia clathrata* L. (rutig buskmätare) bland normalt tecknade artfränder. Djuret, en hona, har vit grundfärg med de för arten karakteristiska bruna tvärlinjerna reducerade till svagt gula tvärfält (på bilden grå). Vingribborna är normalt brunmarkerade och vingfransarna fläckiga. Trots artens stora variationsbredd – från exemplar, där de mörka tvärlinjerna blivit så förtjockade, att vingarna blivit m e m enfärgat mörka, till dylika ljusa – är extremformerna tydligen ganska ovanliga, vilket Hoffmeyer anmärker i De Danske Målere, 1966, under denna art.




Fig. 1. Den ljusa honan av *Chiasmia clathrata* L. invid en normalt tecknad.  $\times 1,5$ .

The light female of *Chiasmia clathrata* L. beside a normally marked one.  $\times 1,5$ . Photo: H. Hellberg.